



Группа компаний  
«АгроХимПром»

## Программа по защите кукурузы



Вариант обработки	Вредоносный объект	До посева	Посев	Всходы	3–5 листьев	5–7 листьев	8–10 листьев	Выбрасывание метелок
Предпосевная обработка	Сплошного действия	<b>ГлифАлт®</b> (2-3 л/га)						
Предпосевная обработка семян	Комплекс болезней	<b>Витацит</b> (2 л/т)						
Обработка гербицидами	Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч. виды ромашки, горца, гречишка выюноквая, виды бодяка, осота, латука				<b>Эфирам®</b> (0,6-0,9 л/га) или <b>Татрел® — 300</b> (0,5-1 л/га)			
	Однолетние двудольные, в т.ч. и некоторые многолетние двудольные сорняки (за исключением горчача ползучего)				<b>СтарТерр</b> (0,4-0,8 л/га)			
	Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам				<b>Тифенс</b> (0,01 кг/га)			
	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные				<b>Римус*</b> (0,03-0,05 кг/га)			
Обработка против многоядных вредителей								
Обработка инсектицидами	Многоядные вредители в т.ч. луговой мотылек, саранчевые				<b>Алтын®</b> (0,1-0,4 л/га)	или	<b>АлтАльф®</b> (0,1-0,3 л/га)	

Примечание:

® — зарегистрированная торговая марка

\* — завершается регистрация препарата под собственной торговой маркой Алтис, ВДГ (250 г/кг римсульфурана)

Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:

1. Обрабатывать баковыми смесями пестицидов. Оптимальную баковую смесь разработают для Вас специалисты нашей компании в зависимости от присутствующих вредных объектов
2. Гербициды Тифенс, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурон-метила) и Римус, ВДГ (250 г/кг римсульфурана) рекомендуется применять с поверхностно-активным веществом — «Стикер» (0,15-0,2 л/га)

Офис продаж: 656065, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, д.98а,  
Тел.: (3852) 48-51-02, 43-39-16, факс: (3852) 226-298, электронная почта: mail@tdahp.ru

www.tdahp.ru